

## バファリン A / 説明と注意

分類	解熱鎮痛薬	
成分	アセチルサリチル酸（1錠中 330mg） 合成ヒドロタルサイト（ダイハッファー HT）（1錠中 100mg）	
効能	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 頭痛・月経痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・咽喉痛・歯痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛・耳痛などの痛みを緩和します。</li> <li>○ 悪寒・発熱時の熱を下げます。</li> </ul>	
服用方法	<p>成人（15歳以上）：1回2錠服用、1日2回まで。</p> <p>なるべく空腹時を避けて服用して下さい。</p> <p>服用間隔は6時間以上あけてください。</p>	
使用上の注意	次の人は服用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>● 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用して喘息を起こしたことがある人</li> <li>● 15歳未満の人（小児の水痘、インフルエンザ等に使用した場合、ライ症候群を起こすことがあります）</li> <li>● 出産予定日12週以内の妊婦</li> <li>● 授乳中の人（服用する場合は授乳を避けてください）</li> </ul>
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本剤を服用している間は、他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬は服用しないでください。</li> <li>● 服用時は飲酒しないでください。</li> <li>● 長期連用しないでください。</li> </ul>
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 医師または歯科医師の治療を受けている人</li> <li>● 妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>● 高齢者</li> <li>● 本人又は家族がアレルギー体質の人</li> <li>● 薬によりアレルギーを起こしたことがある人</li> <li>● 次の診断を受けた人 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍、血液の異常</li> </ul>
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 5～6回服用しても症状が改善しない場合は相談してください。</li> <li>● 添付文書は必ずお読みください。</li> </ul>
アドバイス等	<p>・鎮痛薬は痛みを根本から治すものではなく、一時的に症状をやわらげる「対症療法」にすぎません。痛みが長く続く場合は、必ず医療機関を受診しましょう。</p>	
服用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名		
薬局住所 TEL/FAX		
担当薬剤師		