

ドキシン／説明と注意

分類	鎮痛薬	
成分	2錠中 メカハ [®] モール 500mg、エテンサ [®] ミト [®] 300mg、無水カフェイン 30mg、 トコフェロール酢酸エステル 30mg、ジベンゾ [®] イルチアミン 8mg	
効能	筋肉の異常緊張・けいれん・疼痛をともなう次の諸症を緩和します。 腰痛、肩こり、筋肉痛、四十腰、五十肩、神経痛、寝ちがい、 ねんざ、打撲、スポーツ後の筋肉痛、関節痛。	
服用方法	成人（15歳以上）：1回2錠、1日3回服用 12～14歳 ：1回1錠、1日3回服用 なるべく空腹時を避けて服用してください。	
使用上の注意	次の人は服用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 本剤または解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 ● 12歳未満の人
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤を服用している間は、解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬は服用しないでください。 ● 服用後、眠気があらわれることがあるので、車の運転や機械類の運転操作はしないで下さい。 ● 服用時は飲酒しないでください。 ● 長期連用しないでください。
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師または歯科医師の治療を受けている人 ● 妊婦又は妊娠していると思われる人 ● 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっているまたはその疑いのある小児（12～14歳） ● 高齢者 ● 本人又は家族がアレルギー体質の人 ● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 2週間ほど服用しても症状が改善しない場合は相談してください。 ● 添付文書は必ずお読みください。
アドバイス等	.	
服用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名 薬局住所 TEL/FAX 担当薬剤師		