

新ルル A ゴールド／説明と注意

分類	かぜ薬	
成分	9錠中（成人1日量） クラスチンフマル酸塩 1.34mg、リゾチーム塩酸塩 90mg(力価)、ベラトニン総アルカロイド 0.3mg、アセトアミノフェン 900mg、ジヒドロクロゲンリン酸塩 24mg、ノスビリン 48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、ベンゾチアジン(ビタミン B ₁ 誘導体) 24mg	
効能	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰、くしゃみ、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）を緩和します。	
服用方法	成人（15歳以上）：1回3錠、1日3回 11歳～15歳未満：1回2錠、1日3回 6歳～11歳未満：1回1錠、1日3回 なるべく食後30分以内に服用してください。	
使用上の注意	次の人は服用しないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して喘息を起こしたことがある人 ● 6歳未満の人
	次のことはしないでください	<ul style="list-style-type: none"> ● 本剤を服用している間は、他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）は服用しないでください。 ● 服用後、眠気や目のかすみ等があらわれることがあるので、車の運転や機械類の運転操作はしないでください。 ● 服用時は飲酒しないでください。 ● 長期連用しないでください
	次の人は相談してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 医師または歯科医師の治療を受けている人 ● 妊婦または妊娠していると思われる人 ● 授乳中の人 ● 高齢者 ● 本人または家族がアレルギー体質の人 ● 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 ● 高熱、排尿困難の症状がある人 ● 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
	その他の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・5～6回服用しても症状がよくならないときは相談してください。 ・添付文書は必ずお読みください。
アドバイス等	<ul style="list-style-type: none"> ・あたたかくして、十分な睡眠をとりましょう。 ・栄養をとり、水分も多めにとりましょう。 	
服用して副作用と思われる症状があらわれた場合は、下記にお問い合わせください。		
販売日		
薬局名		
薬局住所 TEL/FAX		
担当薬剤師		